



# FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI



SCHEDA N° 03/09

ORDINE RHIZOPOGONACEAE

GENERE RHIZOPOGON	SPECIE ROSEOLUS	AUTORE (CORDA IN STURM) TH. FRIES	
DATA DI RACCOLTA 04/04/2009	LUOGO DI RACC. ROSOLINA MARE	COMUNE ROSOLINA	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 2	I.G.M.	RACCOGLITORE SARTORI D. - TACCONI A.	

**HABITAT:**

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input checked="" type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: LECCIO PINO		<input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

**ESPOSIZIONE:**

ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : TIPICA DELLE RETRODUNE CON PRESENZA DI GINEPRO

NOTE : NON DI FACILE INDIVIDUAZIONE PER IL SUO MODO DI CRESCITA SEMI-IPOGEO

MICROSCOPIA: OSSERVAZIONI SPORE, BASIDIOLI, IFE STRUTTURALI DELLA CARNE

BIBLIOGRAFIA : I FUNGHI DAL VERO VOL. 3 DI BRUNO CETTO

DETERMINATORE SIGNORINI D.

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI  FRESCHI  SECCHI




CARPOFORI GLOBOSI



SUPERFICIE LISCIA



CARNE



SPORE BIGUTTULATE



BASIDIOLI



IFE DELLA GLEBA



## **DESCRIZIONE**

### **CARPOFORO**

**DI FORMA GLOBOSA DI 2-5 CM. DI DIAMETRO, DAPRIMA BIANCO POI GIALLASTRO E INFINE BRUNO OLIVASTRO A COLOR ROSA-ROSSASTRO, NELLA PARTE SOTTOSTANTE CI EVIDENTI RESTI DI IFE ASSOMIGLIANTI A DELLE RADICI**

### **GLEBA**

**DA GIOVANE BIANCO A BRUNO OLIVASTRO, LA CARNE È PIENA DI PICCOLE CAVITÀ  
ODORE FUNGINO DA GIOVANE A MATURAZIONE SGADEVOLE**

### **HABITAT**

**BOSCHI DI LECCIO E PINO IN ZONA MEDITERRANEA, NELLE RETRODUNE SIA FUORI CHE DENTRO IL BOSCO, SEMI NASCOSTA DAL TERRENO PER LA NASCITA SEMI-IPOGEO**

### **MICROSCOPIA**

**SPORE 7 - 10 x 3-5 MICRON CILINDRACEE IALINE AL MICROSCOPIO BIGUTTULATE**

**BASIDIOLI A FORMA CLAVATA**

**IFE DELLA TRAMA IMMENIALE CILINDRICHE 5-8 DI LARGHEZZA**