

SCHEDA N° 23/10

ORDINE AURICULARIALES

GENERE AURICULARIA	SPECIE A. AURICULA-JUDAE	AUTORE (L.:FR.) SCHROETER	
DATA DI RACCOLTA 19.06.2010	LUOGO DI RACC. S.ANNA	COMUNE BREGANZE	PROV. VI
ALTITUDINE S.L.M. 500 M	I.G.M. 103 1 MAROSTICA	RACCOGLITORE VITALIANO MILANESE	

HABITAT:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| <input type="checkbox"/> BOSCO DI: ROVERELLA, CASTAGNO, CARPINO E FAGGIO | | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input checked="" type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input checked="" type="checkbox"/> MORTO | DI <input type="checkbox"/> FAGGIO |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE : CARPOFORI DISTRIBUITI SINGOLARMENTE E/O IN PICCOLI GRUPPI SU RAMI ABBATTUTI DI FAGGIO.

MICROSCOPIA: SPORE CILINDRICO-ALLANTOIDI, TALORA PLURIGUTTULATE, LISCE; 14.5-17.5 X 7.5-8.6 MICRON.

BIBLIOGRAFIA : PAPETTI C., CONSIGLIO G., SIMONINI G. – ATL. FOTOGRAFICO DEI FUNGHI D'ITALIA, VOL.1 – A.M.B. TRENTO

DETERMINATORE VITALIANO MILANESE

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI

 <p>CARPOFORO</p>	 <p>SPORE</p>	 <p>IFE</p>
 <p>PELI</p>		



DESCRIZIONE

BASIDIOCARPO. SESSILE, FOGGIATO A MO' DI COPPA ROVESCIA, ESTERNAMENTE VENOSA, DI C.A. 5-6 CM. DI DIAMETRO, IN MOLTI CASI CON POSTURA MENSOLIFORME. SUPERFICIE PILEICA LISCIA, TENDENZIALMENTE GLABRA; DI COLORE BRUNO, BRUNO-ROSSASTRO. ORLO ONDULATO.

IMENOFORO. LISCIO, ONDULATO; CONCOLORE AL RESTO DEL FUNGO O LEGGERMENTE DECOLORANTE.

CARNE. TENACE CON TENDENZA GELATINOSA (AMBIENTE DI RACCOLTA PIUTTOSTO UMIDO), BRUNA STRA.