



# FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI



SCHEDA N° 57/2010

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Clitocybe</i>	SPECIE <i>C. fragrans</i>	AUTORE (With.) P. Kumm.	
DATA DI RACCOLTA 12-11-2010	LUOGO DI RACC. bosco Nordio	COMUNE Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 0 m.	I.G.M. 169 1 S. Anna	RACCOGLITORE Voto Pietro	

**HABITAT:**

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI    | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI                     | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA                   |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO    | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO                    | <input type="checkbox"/> ARENILE                             |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA        | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A                 |  |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO                      | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO                     |
| BOSCO DI :                               |  | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO     | <input type="checkbox"/> IN RADURE                           |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO        | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI   |

**ESPOSIZIONE:**

- ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

- ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : gregari su foglie secche di leccio, appena dentro il margine del bosco

NOTE :

MICROSCOPIA:

BIBLIOGRAFIA : Bon M. 1997: Les *Clitocybes*, *Omphales* et ressemblants. Doc. myc. mémoire hors sèrie n. 4

DETERMINATORE Voto Pietro

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI  FRESCHI  SECCHI




basidiomi in habitat




un cappello in primo piano



lamelle in primo piano



spore in rosso Congo



epicute



imenio e subimenio



#### **DESCRIZIONE**

Cappello fino a 4 cm ca., prima convesso poi più o meno depresso o ombelicato, striato per 1/4 o 1/3 (un esemplare fino a 1/2) di raggio; margine a lungo rivolto in basso, sovente un po' sinuoso-ondulato; igrofano, al disco beige - bruno, all'esterno beige o beige - biancastro con una parvenza di sfumatura carnicina (blandamente ocellato); aspetto un po' lucido.

Lamelle fitte, da adnate a decorrenti, con molte lamellule, beige - rosate, in exsiccata grigiastre - rosastre; filo un po' ondulato. Sporata beige.

Gambo fino a 55 x 4 mm, sovente sinuoso, a volte ritorto, cilindraceo ma con ispessimento verso la base, (sub)concolore col cappello, glabro o leggermente fibrilloso, con feltro miceliare bianco alla base, più o meno farcito poi cavo.

Carne biancastra, odore aromatico di anice.

Epicute in cutis con ife esterne x 2-4  $\mu\text{m}$ , coricate ma alcune sub erette, a pigmento intracellulare.

Spore 6-7,3 x 3,7-4,5  $\mu\text{m}$ , ellissoidali, in maggioranza tutte in tetradi in exsiccata.

Basidi 19-26 x 5-6  $\mu\text{m}$ , 4-sporici.

Subimenio filamentoso.

Cistidi assenti.

Fibbie ovunque e abbondanti.