



**SCHEDA N° 60/2010** **ORDINE Cortinariales**

<b>GENERE</b> Cortinarius	<b>SPECIE</b> C. cedretorum var. subereturum	<b>AUTORE</b> Maire	
<b>DATA DI RACCOLTA</b> 26-10-2004	<b>LUOGO DI RACC.</b> bosco Nordio	<b>COMUNE</b> Chioggia	<b>PROV.</b> VE
<b>ALTITUDINE S.L.M.</b> 0 m.	<b>I.G.M.</b> 169 1 S. Anna	<b>RACCOLTITORE</b> Voto Pietro	

**HABITAT:**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI               | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI                     | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA                   |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO               | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO                    | <input type="checkbox"/> ARENILE                             |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA                   | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A                 |  |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME            | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO                      | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO                     |
| <b>BOSCO DI :</b>                                   |  | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO                | <input type="checkbox"/> IN RADURE                           |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO                   | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI   |

**ESPOSIZIONE:**

- ASSOLATA  OMBROSA  MEDIA

**UMIDITA' DEL TERRENO**

- ACQUITRINOSO  MOLTO UMIDO  UMIDO  ASCIUTTO  SECCO

**VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :** Quercus ilex e Quercus robur

**NOTE :**

**MICROSCOPIA:**

**BIBLIOGRAFIA :** vedi note in fondo

**DETERMINATORE** Voto Pietro

**RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI**  FRESCHI  SECCHI

**Cortinarius cedretorum**  
var. subereturum Maire

Gamba giallo-verde a tinte violacee, tozzo, non siancato

Lamelle fitte, giallastro-oliva, sottocuticola, cortecchia e zona soprammentale giallo (-verde)

Bulbo, soprattutto l'apice, rosso

Cappello rosso-rame (giallo dove coperto da foglie)

Margine pileico giallo olivastro

Dettaglio di cortina gialla

**scheda descrittiva dei macrocaratteri compilata nel 2004**




raccolta del 2007



raccolta del 2009



altra raccolta del bosco Nordio



spore in KOH 5%



## DESCRIZIONE

I caratteri macroscopici principali sono descritti nella scheda originalmente compilata nel 2004 e su riprodotta.

Importante, tra i caratteri microscopici, è la misurazione delle spore che fu effettuata tre volte con i seguenti risultati:

- a) (n=27) (9,2) 9,5 - 11,2 (12,1)  $\times$  5,6 - 7,0 (7,5)  $\mu\text{m}$ , media: 10,34  $\times$  6,39  $\mu\text{m}$ , Q = 1,4 - 2,0;
- b) (n=50) (9,0) 9,5 - 11,8 (12,7)  $\times$  5,8 - 7,0  $\mu\text{m}$ , media: 10,21  $\times$  6,12  $\mu\text{m}$ , Q = 1,4 - 1,8 (2,1);
- c) (n=30) 10,7 - 12,2 (12,7)  $\times$  5,8 - 7,8 (8,8)  $\mu\text{m}$ , media: 11,42  $\times$  6,90  $\mu\text{m}$ , Q = 1,4 - 1,8 (2,0).

Note: Maire creò la specie *Cortinarius cedretorum* nel 1914 riportandola con spore 12 - 14  $\times$  7 - 8  $\mu\text{m}$ .

Nel 1937 pubblicò, nelle "Mémoires de la Société des sciences naturelles du Maroc", N° XLV, questa varietà col seguente testo:

### 902. *Cortinarius cedretorum* Maire

#### a) var. *typicus* Maire, n. nom.

Sous les Cedrus: Ari Hebbri (Moyen-Atlas), 1900 m. [48]; Azrou, 1700 m. [69]; Ifrane, 1650-1700 m. [48].

#### b) var. *suberetorum* Maire, n. var.

Sous Quercus Suber L.: forêt de la Mamora [48,53].

A typo differt sporis minoribus, 10 - 12  $\times$  5 - 6,5  $\mu$  (nec 12 - 14  $\times$  7 - 8  $\mu$ ); odore *Cortinarii purpurascens* Fr.; lamellis antice haud violaceis; bulbo haud cupreo.

Aire géogr. : Algérie.

Essa non è comunque misconosciuta ai soci AMB lettori di Rivista di Micologia giacché le è stata già dedicata una immagine di copertina (Anno XXXV - N. 1, gennaio-aprile 1992), foto di M. Marchetti, e un contributo (Anno XXXVIII - N. 2, maggio-agosto 1995), in un articolo di R. Brotzu.

Il taxon non è raro nel bosco Nordio dove puntualmente produce le sue fruttificazioni, mai copiose, ogni autunno.