



SCHEDA N° 48/2010		ORDINE Entolomatales	
GENERE Entoloma	SPECIE E. caeruleum	AUTORE (P.D. Orton) Noordel.	
DATA DI RACCOLTA 17-11-2010	LUOGO DI RACC. bosco Nordio	COMUNE Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 0 m.	I.G.M. 169 1 S. Anna	RACCOLITORE Voto, Pizzardo, Cappelli, Monti	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI :		☐ RADO ☐ FITTO
☒ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☒ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : farnie e pini

NOTE :

MICROSCOPIA:

BIBLIOGRAFIA : Noordeloos - Entoloma Fungi Europaei vol. 5 (1992) e 5A (2004)

DETERMINATORE Voto Pietro

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI




basidiomi in habitat (foto Pizzardo)




cappello




gambo glabro o finemente substriato (foto Pizzardo)



epicute



cheilocistidi



spore



DESCRIZIONE

Cappello 4-5 cm, blu-viola-nero e squamuloso nella depressione discale, all'esterno molto più chiaro e grigio-imbrunito con squamule-fibrille radiali.

Lamelle bianche con filo concolore.

Gambo 60-80 x 4,5-5 mm, cilindraceo-ritorto, concolore all'esterno del cappello, glabro o con vaga fine striatura.

Epicute tricotermica verso il disco, con terminali cilindrico-claviformi, x 8-22 µm e pigmento intracellulare.

Spore 9-11,3(12) x 7-7,7(8,5) µm, con 5-7 spigoli.

Cheilocistidi numerosi, cilindracei o rastremati in apice, settati, ultimo elemento 20-62 x 7-12 µm; filo sterile.

Giunti a fibbia assenti.

Note: è la prima segnalazione in questo bosco; il gambo glabro è un utile macrocarattere per evitare una possibile confusione con *E. mougeotii*, anch'esso presente (si consideri p. es. *E. mougeotii* var *incarnatus* M.M. Moser ined. descritto con cappello a sfondo rossastro-incarnato-brunastro con squamette blu-viola presenti solo all'ombelico e al margine e distinguibile per il gambo con fini squame fibrillose - da Moser, Guida alla determinazione dei funghi Vol. 1°).