



FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI



SCHEDA N° 47/2010

ORDINE Entolomatales

GENERE <i>Entoloma</i>	SPECIE <i>E. mougeotii</i>	AUTORE (Fr.) Hesler	
DATA DI RACCOLTA 5-10-2007	LUOGO DI RACC. bosco Nordio	COMUNE Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 0 m.	I.G.M. 169 1 S. Anna	RACCOGLITORE Voto Pietro	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input checked="" type="checkbox"/> SENTIERO NEL BOSCO |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI : | | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : biancospino, muschio, erba, su fondo sabbioso

NOTE :

MICROSCOPIA:

BIBLIOGRAFIA : Noordeloos - *Entoloma Fungi Europaei* vol. 5 (1992) e 5A (2004)

DETERMINATORE Voto Pietro

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



gambo con flocculi scuri e lamelle bianche a filo concolore




basidiomi in habitat



cappello squamuloso



cheilocistidi



epicutie in rosso Congo



spore



DESCRIZIONE

Cappello fino a 28 mm, convesso a disco depresso e margine molto involuto, squamuloso del tutto o all'esterno radialmente fibrilloso, bluastr-violaceo, poi imbrunente fuori dal disco.

Lamelle largamente adnate – subdecurrenti, inizialmente da bianche a grigio-rosa; filo concolore, minutamente crenulato (lente).

Gambo fino a 58x6 mm, cilindraceo, fragile, concolore col cappello o più pallido, con minuta ornamentazione flocculosa più scura soprattutto nel terzo superiore che può terminare con una sorta di colletto violaceo con al di sopra l'estremo apice bianco, cavo.

Epicute in trichoderma con terminali cilindracei o subclaviformi, pigmento intracellulare.

Spore 9-11,7 x 6,4-7,2 μm , con 6-8 spigoli, Qm 1,5-1,7. Basidi 4-sporici.

Cheilocistidi numerosi, da strettamente clavati – subcilindrici a largamente clavati, 20-30 x 6,5-10 μm , provenienti da ife filamentose e sovente settate.

Giunti a fibbia assenti ovunque.

Note: bella specie (di cui è segnalata anche una versione a filo bruno e non seghettato: *E. mougeotii* var. *fuscomarginatum* Noordel.) confondibile con diverse altre similari, quali per esempio *E. corvinum* che ha colori più scuri – nerastri, privi di toni viola, *E. serrulatum* che ha filo seghettato e nero, *E. caeruleum* che ha gambo glabro.