



FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI



SCHEDA N° 59/2010

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Galerina</i>	SPECIE <i>G. laevis</i>	AUTORE (Pers.) Singer	
DATA DI RACCOLTA 12-11-10	LUOGO DI RACC. bosco Nordio	COMUNE Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 0 m.	I.G.M. 169 1 S. Anna	RACCOGLITORE Voto P.	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |

BOSCO DI :

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input checked="" type="checkbox"/> TRA MUSCHIO | <input type="checkbox"/> VIVO | <input type="checkbox"/> MORTO |

ESPOSIZIONE:

- | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ASSOLATA | <input type="checkbox"/> OMBROSA | <input type="checkbox"/> MEDIA |
|--|----------------------------------|--------------------------------|

UMIDITA' DEL TERRENO

- | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ACQUITRINOSO | <input type="checkbox"/> MOLTO UMIDO | <input checked="" type="checkbox"/> UMIDO | <input type="checkbox"/> ASCIUTTO | <input type="checkbox"/> SECCO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : zona rada con sabbia più o meno affiorante e copertura muscosa

NOTE :

MICROSCOPIA:

BIBLIOGRAFIA : Bon M. - 1992: Clé monographique des espèces galéro-naucorioides. Doc. Myc. 21 (84): 1-89

DETERMINATORE Voto Pietro


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI




basidioma in habitat




imenio




epicute in rosso Congo



cheilocistidi



spore in rosso Congo



caulocistidi



DESCRIZIONE

Cappello 1 cm, convesso con cenno di umbone basso, strie non visibili nell'esemplare di questa raccolta, opaco, giallo-ocra con margine più sbiancato.

Lamelle ventricose con dentino subdecorrente, con lamellule (1 L = 3-7 l), rade, giallastre-brune.

Gambo 30x15 mm, cilindraceo, biancastro - ialino con pallida sfumatura gialla, verso il basso sempre più vistosamente mazzato di zone ingrigite, senza velo parziale, con debole copertura pruinoso.

Epicute in xerocutis di ife con diam. fino a ca. 12 μ m, a parete spessa, con forte pigmento epimembranario e intraparietale, ife della subcute larghe anche fino a ca. 20 μ m.

Spore 7,5-10 x 4,2-5,3 μ m, ovo-amigdaliformi, ovo-cilindracee, sublisce, senza poro germinativo.

Basidi ca. 25-35 x 7-9 μ m, 4-sporici; trama regolare.

Cheilocistidi ca. 20-40 x 6-9, in maggioranza lageno-capitati con capitulo 3-6 μ m, vari lageniformi, qualcuno lageniforme-bifido; pleurocistidi assenti.

Giunti a fibbia assenti.

Caulocistidi lageno-capitati come sul filo o cilindro-capitati.

Note. La specie è comune nelle zone a muschio del litorale polesano, con o senza fondo sabbioso, e non manca di fare presenza anche nelle aree aperte del bosco Nordio dove tappeti di muschio ricoprono la sabbia affiorante.