



SCHEDA N° 56/2010	ORDINE Agaricales
-------------------	-------------------

GENERE Panaeolus	SPECIE P. guttulatus	AUTORE Bres.
DATA DI RACCOLTA 12-11-10	LUOGO DI RACC. bosco Nordio	COMUNE Chioggia PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 0 m.	I.G.M. 169 1 S. Anna	RACCOGLITORE Voto Pietro

HABITAT:

☒ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☐ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	☐ BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI :		☐ RADO ☐ FITTO
☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ IN RADURE
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO DI	

ESPOSIZIONE:

☒ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☐ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : **detriti lignicoli. a bordo prato lecci, farnie e pioppi**

NOTE :

MICROSCOPIA:

BIBLIOGRAFIA : Ola'h 1970: Le genre *Panaeolus*; Bon & Courtecuisse 2003: Clé de détermination du genre *Panaeolus*. Doc.myc. 127-128

DETERMINATORE **Voto Pietro**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI




BASIDIOMI IN HABITAT




ALTRI BASIDIOMI




LAMELLE



EPICUTE CON DERMATOCISTIDI



CHELOCISTIDI



SPORE



DESCRIZIONE

Cappello 15-25 mm, da campanulato a convesso, irregolare - asperulato, margine da liscio a solcato - sinuoso, nero-bruno sbiadente a bruno (-oliva).

Lamelle non molto fitte, ventricose, adnate, nero-grigie a maturità, filo bianco.

Gambo 20-30x2-4 mm, cilindraceo, brunastro sotto un'abbondante copertura bianca.

Epicute cellulare polistrato; dermatocistidi cilindracei o un po' claviformi, a parete spessa 1-3 μ m, con o senza copertura mucosa apicale.

Spore 9,2-10(12) x 4,6-5,4(6) μ m, frontalmente ovoidali, di lato appiattite o subamigdaliformi, con evidente poro germinativo.

Basidi tetrasporici.

Cheilocistidi 23-40 x 4-6 μ m, folti, cilindracei o un po' claviformi, a parete sottile.

Pleurocistidi assenti.

Note: specie non diffusissima ma regolarmente raccolta ogni anno, caratterizzata da colori molto scuri, benché sbiadenti, assenza di pleurocistidi e spore relativamente piccole, per il genere, e strette.