

SCHEDA N° 12/2011

ORDINE Agaricales

GENERE Amanita	SPECIE A. pachyvolvata	AUTORE (Bon) Krieglest.	
DATA DI RACCOLTA 23-10-11	LUOGO DI RACC. colline di cavaso del T	COMUNE Cavaso del tomba	PROV. TV
ALTITUDINE S.L.M. 600	I.G.M. 083 I Treviso	RACCOGLITORE Franco Flavio Pinton	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRATERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI : LATI-AGHIFOGLE | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : abete bianco-rosso, castagno, ciliegio

NOTE : due soli carpofori molto interrati tra l'erba e aghi di Abies alba. in periodo siccitoso

MICROSCOPIA: spore globose 9-10x11-13 um non amiloidi, subimenio filamentoso

BIBLIOGRAFIA : Funghi d'Italia Zanichelli a pag. 30 al n°26

DETERMINATORE Franco Flavio Pinton

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



AMANITA PACHYVOLVATA I



A.PACHYVOLVATA CAPPELLO CON STRIATURE MOLTO EVIDENTI




A. PACHYVOLVATA PARTICOLARE DELLA VOLVA



A.PACHYVOLVATA CAPPELLO LISCIO E LUCENTE



BASIDI TETRASPORICI



SPORE X1000 IN IMMERSIONE

DESCRIZIONE

AMANITA PACHYVOLVATA (Bon) Krieglsteiner

Tassonomia:

Classe: Basidiomycetes

Ordine: Agaricales

Famiglia: Amanitaceae

Genere: Amanita

Specie: A.pachyvolvata

sezione Amanitopsis (Roze) Konrad et Maubl._ Stipite non bulboso, con anello oblitterato, subito evanescente, velo generale da membranoso a submembranoso con o senza u.a.f.

CAPPELLO:

60-120mm di diametro, prima convesso poi piano, raramente umbonato, di colore grigio, grigio-brunastro, più scuro al centro e verso il margine, traslucido; questi e lungamente e profondamente striato.

LAMELLE: poco fitte e di colore bianco, raramente inercalate da lamellule.

GAMBO:

120-180 x 10-30 mm cilindrico, attenuato all'apice, leggermente ingrossato alla base, regolare, di colore bianco-grigiastro, sovente ricoperto da fiocchettature o zebraature concolori, all'inizio farcito, cavo con l'età.

CARNE: morbida ed immutabile di colore bianco, senza adori o sapori caratteristici.

VOLVA:

molto ampia ed inguainante, alta sul gambo, di colore bianco, sovente macchiata di brunastro.

MICROSCOPIA

spore: 9-13 micron, sferiche, non amiloidi.

basidi: mediamente 60 micrometri, leggermente clavati, tetrasporici.

VELO GENERALE:

formato da ife filamentose intrecciate e settate, di larghezza 3,5-8 micron.

HABITAT:

di norma cresce solitaria o in alcuni esemplari nei boschi di latifolia con preferenza per la roverella ed il castagno su suolo acidofilo. dalla primavera all'autunno

Nota: i carpofori, reperiti in due soli esemplari tra loro vicini erano in prossimità di abete bianco; molto interrati. Specie poco comune.

Foto di: Franco Flavio Pinton