



FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI



SCHEMA N° 2011/19

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Hemimycena</i>	SPECIE <i>H. cucullata</i>	AUTORE (Pers. : Fr.) Singer	
DATA DI RACCOLTA 12-11-2011	LUOGO DI RACC. bosco Nordio	COMUNE Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 0 m.	I.G.M. 169 I S. Anna	RACCOLTITORE Voto Pietro	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ PRATI ERBOSI | ☐ ORTI E GIARDINI | ☐ MARGINI DI STRADA |
| ☐ TERRENO NUDO | ☐ TERRENO SABBIOSO | ☐ ARENILE |
| ☐ TORBIERA | ☐ TERRENO COLTIVATO A | |
| ☐ ARGINE DI FIUME | ☐ LUOGO BRUCIATO | ☐ BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI : | | ☐ RADO ☐ FITTO |
| ☐ DENTRO AL BOSCO | ☒ AI MARGINI DEL BOSCO | ☐ IN RADURE |
| ☐ SU LEGNO | ☐ VIVO ☐ MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☒ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : raccolto su uno spesso strato di humus di foglie di leccio cadute, anche sulle pigne di leccio

NOTE :

MICROSCOPIA:


BIBLIOGRAFIA : Antonin & Noordeloos 2004; Breitenbach & Kränzlin 1991

DETERMINATORE Voto Pietro


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☐ FRESCHI ☒ SECCHI




basidiomi in habitat




spore in rosso Congo




epicute in rosso Congo



dermatocistidi in rosso Congo



cheilocistidi in rosso Congo



caulocistidi in rosso Congo



DESCRIZIONE

Cappello 1-2,3 cm, campanulato poi a margine revoluto, lungamente ma debolmente striato, bianco o beige-crema pallido, eventualmente giallastro al centro, minutamente pruinoso.

Lamelle un po' fitte, con lamellule, smarginate, bianche.

Gambo 40-70 x 1,5-2 mm, per 1/3 interrato nello spesso strato di foglie di leccio a terra, cilindraceo, biancastro subialino, pruinoso nella parte emersa, distintamente strigoso lungo tutta la parte interrata, di consistenza un po' rigida.

Epicute costituita esternamente da uno strato di cellule pseudoparenchimatiche (fino a x 20 μ m) con presenza anche di qualche ifa esile, con numerosi dermatocistidi (17-40 x 3-11 μ m), a volte riuniti in ciuffo, principalmente subulati e sovente sinuosi, ad apice rastremato ma non acuto, eventualmente settati verso la base, nascenti dagli elementi cellulari o come terminazioni erette di ife coricate; nella zona inferiore le cellule si allungano e diventano ventricoso-affusolate.

Spore 8-11(11,7) x 3,5-5(5,3) μ m, subfusiformi o strettamente ellissoidali, di lato subamigdaliformi o strettamente larmiformi, apicolo ben visibile e a volte particolarmente stirato, ialine.

Basidi 4-sporici, 25-30 x 7-9 μ m.

Cheilocistidi molto fitti, 20-38(42) x 4,5-11 μ m, lageniformi o fusiformi, alcuni presentano alla base porzioni settate che possono avere parete ispessita, alcuni subcapitati; elementi cellulari alla base dei cheilocistidi e nel subimenio.

Caulocistidi numerosi, ca. 20-35 x 2,7-6 μ m, cilindraceo-ventricosi.

Giunti a fibbia numerose.

Note. Questa specie non è diffusissima nel bosco Nordio ma ogni autunno fa la sua moderata apparizione, finora sempre raccolta a margine di spazi un po' aperti.

***H. lactea* var. *tetraspora* (Kühner & Valla) Courtec., macroscopicamente simile, è dotata di suprapellis con esili ife filamentose, diramate, diverticolate, a terminali filiformi, con rada presenza di dermatocistidi e assenza di elementi rigonfi.**