



FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI



SCHEDA N° 2011/20

ORDINE Agaricales

GENERE Marasmius	SPECIE M. wynneae	AUTORE Berk. & Broome	
DATA DI RACCOLTA 12-11-2011	LUOGO DI RACC. bosco Nordio	COMUNE Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 0 M.	I.G.M. 169. 1 S. Anna	RACCOGLITORE Voto Pietro	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| <input type="checkbox"/> BOSCO DI : | | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU RESIDUI VEGETALI | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : **lecci, pini**

NOTE :

MICROSCOPIA:

BIBLIOGRAFIA : **Bon M. - 1999: Flore mycologique d'Europe 5, Les Collybio-marasmioides et ressemblants. Doc. Myc. Mémoire hors-série n. 5**

DETERMINATORE **Voto Pietro**


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI




basidiomi in habitat




gambo e lamelle



spore in rosso Congo



subcute in rosso Congo



epicute in rosso Congo



basidio (sx), cheilocistidio (dx)



DESCRIZIONE

Cappello 2,5-4,5 cm, inizialmente bianco, convesso, liscio, poi bruno-grigio con sfumatura lilla, spianato-depresso con margine scanalato, sbiadente da secco.

Lamelle non collariate, rade, beige con sfumatura lilla, ventricose, filo un po' spesso.

Gambo 40-55x2-4 mm, tendente a rastremarsi verso la base, bianco in estremo apice, poi una stretta striscia ocracea e tutto il resto grigio-purpureo scuro, pruinoso.

Epicute in imenoderma di cellule irregolarmente ovoidali-clindraccie, piccole, molto compatte, a parete sovente spessa; subcute di ife intrecciate e ramificate.

Spore 6-8 x 3-4 μm , strettamente ellissoidali, di lato strettamente larmiformi con tendenza dell'apicolo a stirarsi verso il lato adassiale.

Basidi 4-sporici, 28-38x4-5,5 μm .

Cheilocistidi molto diradati, l'unico misurato e fotografato di dimensioni ca. 20 x 7 μm , deforme, a parete spessa, filo fertile.

Giunti a fibbia presenti.

Note: Nella chiave di Bon (1999) accanto alla specie tipo viene segnalata anche *Marasmius wynneae* fo. *pachyphyllus* Bon che si differenzia per l'ispessimento del filo lamellare e la rarefazione dei cheilocistidi. Entrambi i caratteri sono riscontrati in questa raccolta, comunque in Antonín & Noordeloos (2010) viene considerata sinonimo.