

SCHEDA N° 01/2012

ORDINE Agaricales

GENERE Amanita	SPECIE dryophila	AUTORE G.Consiglio-M.Contu	
DATA DI RACCOLTA 17/05/2012	LUOGO DI RACC. Monte comun	COMUNE Grezzana	PROV. VR
ALTITUDINE S.L.M. 650 m.s.l.m.	I.G.M. 124 IV	RACCOGLITORE Daniele Sartori	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input checked="" type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: Di latifolia		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI <input type="checkbox"/>

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Gastagno-roverella

NOTE: Eseguita microscopia su fungo fresco, la misure sporiali prese da sporata.

MICROSCOPIA: Spore-Basidi-Velo generale-Cuticola

BIBLIOGRAFIA: Determinazione fatta attraverso studio con Marco Contu.

DETERMINATORE Daniele Sartori-Marco Contu

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



Fungo in habitat




Esemplare giovane in habitat




Spore 600 ingrandimenti



Basidi 400 ingrandimenti



Struttura del velo generale 100 ingrandimenti



Cuticola 200 ingrandimenti



DESCRIZIONE

CAPPELLO 30-100 mm di diametro, prima convesso, poi piano, con nella parte discale un leggero umbone, di colore bruno scuro nei giovani esemplari, tendente a schiarirsi notevolmente fino a color crosta di pane, specialmente verso il bordo, profondamente striato fino ad un quarto del diametro del cappello. Ornato da resti di velo generale di colore bianco. orlo regolare.

IMENOFORO formato da lamelle di colore biancastro, larghe e distanti dal gambo, orlo liscio.

GAMBO 10-15 (30) x 80-130 mm cilindrico, centrale, decorato da frangie di colore crema chiaro, inguainato alla base da una volva molto persistente, di colore bianco, con sfumature bruno chiaro, profondamente interrata.

CARNE molto fragile, specialmente nel cappello, di colore bianco, senza odori particolari, sapore dolce.

MICROSCOPIA

SPORE rotonde con misure che vanno da 6.89 a 9.94 μm di diametro, non amiloidi.

BASIDI tetrasporici, di forma clavata, non misurati

CUTICOLA formata da ife piane, settate, di larghezza 3-6 μm .

VELO GENERALE formato da ife piane, con presenza di numerosi sferocisti, non misurati.