

SCHEDA N° 10/2012

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Galerina</i>	SPECIE <i>laevis</i>	AUTORE (Pers.) Singer	
DATA DI RACCOLTA 07/11/2012	LUOGO DI RACC. Grezzana	COMUNE Grezzana	PROV. VR
ALTITUDINE S.L.M. 50 mt.	I.G.M. 124 IV	RACCOGLITORE Daniele Sartori	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input checked="" type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI :		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI <input type="text"/>

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA
 OMBROSA
 MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO
 MOLTO UMIDO
 UMIDO
 ASCIUTTO
 SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Albicocco-Caco-Roseti-Gelsomino-Edera

NOTE : Eseguita microscopia su esemplari freschi. Sinonimo *Galerina graminea* (Velenosky) Kuhner

MICROSCOPIA: Spore-Cheilocistidi-cuticola.

BIBLIOGRAFIA : A.Zuccherelli I funghi delle pinete mediterranee vol 1°-A Testoni I funghi del ferrarese-A.M.B. Atlante fotografico dei funghi d'Italia vol.2°-G.Eyssartier-P.RouxLe guide des champignons France et Europe-B.Cetto i funghi dal vero Vol:7°-J.Breitembach-F.Kranzlin Les champignons de Suisse Vol. 5°.

DETERMINATORE Daniele Sartori

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI




Funghi in habitat




Funghi in habitat




Spore 1000 ingrandimenti immersione



Cheilocistidi 200 ingrandimenti



Cheilocistidi 600 ingrandimenti



Cuticola 100 ingrandimenti



DESCRIZIONE

CAPPELLO 5-25 mm. di diametro, prima convesso-campanulato, poi appianato, cuticola igrofana, di colore giallo-aranciato, giallo ocraceo, negli esemplari asciutti giallo pallido specialmente al centro del cappello, fortemente striata, con rigature che partono dal bordo e vanno fino quasi all'umbone centrale.

IMENOFORO formato da lamelle adnate, molto spaziate tra loro, di colore ocraceo pallido, intervallate da numerose lamellule.

GAMBO 15-30 x 1,5-2,5 mm cilindrico, fistuloso, qualche volta contorto, di colore bianco, bianco-grigiastro, specialmente verso la base, senza resti di velo.

CARNE fibrosa nel gambo, molto sottile e fragile nel cappello, con colore allo sporoforo, non rilevati odori o sapori particolari.

HABITAT tra l'erba in luoghi arieggiati e concimati specialmente di orti e giardini, dalla fine dell'estate fino ad autunno inoltrato.