

SCHEDA N° 19-2012

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Lepiota</i>	SPECIE <i>Lepiota brunneoincarnata</i>	AUTORE CHODAT & MARTIN	
DATA DI RACCOLTA 16 / 11 / 2012	LUOGO DI RACC. Porto Fossone	COMUNE Rosolina	PROV. RO
ALTITUDINE S.L.M. 4 m.	I.G.M. 169 - 1 S. Anna	RACCOGLITORE A. M. Marini E. Zanella	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI :		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI <input type="text"/>

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Leccio

NOTE :

MICROSCOPIA: Spore ellittiche 7-9 (10) x 4-5 cheilocistidi clavati-ventricosi, cuticola formata da ife rialzate, non setate.

BIBLIOGRAFIA : M. Candusso - G. Lanzoni - FUNGI EUROPAEI - LEPIOTA (1990) Libreria Editrice - G. Biella - Saronno

DETERMINATORE E. Zanella A. M. Marini

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI




HABITAT




BASIDIOMI IN HABITAT




RESIDUI VELARI DEL GAMBO



SPORE



CHEILOCISTIDI



IFE DELLE CUTICOLA



DESCRIZIONE

Cappello: 2-5 cm. emisferico, convesso, poi aperto, umbone molto ottuso ma ben evidente. Cuticola unita e tomentoso-squamosa al disco che si presenta ben differenziato, bruno scuro con toni vinosi, in periferia disscociata in squamette +/- concentriche, feltrate bruno scuro in contrasto con lo sfondo carnicino, margine appendicolato negli esemplari giovani.

Lamelle: fitte con numerose lamellule, biancastre, filo un pò crenulato e fioccoso visibile alla lente.

Gambo: 2-4 cm. +/- cilindrico, bianco all'apice e ricoperto da fibrille bianche con zona anulare abbastanza netta formata da squame concolori al centro del cappello che si ripetono fino alla base a piccoli tratti, formando ghirlande con andamento a spirale; sottofondo bianco poi a maturità carnicino.

Carne: biancastra, carnicina nella corteccia del gambo, più rosata-vinosa alla base, odore acidulo-fruttato intenso.

Habitat: spiazzati erbosi ai margini dei sentieri, di preferenza su substrato con resti legnosi.