

SCHEDA N° 24/2012

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Conocybe</i>	SPECIE <i>C. tenera</i>	AUTORE (Schaeff. : Fr.) Kühner	
DATA DI RACCOLTA 5-5-2012	LUOGO DI RACC. bosco Nordio	COMUNE Chioggia	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 0 m.	I.G.M. 169 I S. Anna	RACCOGLITORE Voto Pietro	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input checked="" type="checkbox"/> TERRENO A FONDO SABBIOSO CON MUSCHIO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI :		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> SU SENTIERO
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : lecci, pioppi

BIBLIOGRAFIA Hausknecht A. - 2009. Fungi Europaei, Volume 11: Conocybe - Pholiotina

DETERMINATORE Voto P.

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI


FRESCHI SECCHI




cappello




gambo e lamelle




caulocistidi in floxina



spore



basidi tetrasporici in floxina



epicute in KOH



DESCRIZIONE:

Cappello 2 cm, convesso, striato, bruno, parte centrale sbiadita a ocraceo al momento della raccolta, interamente bruno medio in essiccata.

Lamelle bruno giallastre chiare, con lamellule, subfitte, ventricose verso il margine, filo pallido.

Gambo 57 x 2,5 mm con bulbillo di ca. 4 mm, metà inferiore con un rivestimento bianco e una leggermente striato-solcato, verso l'apice più distintamente striato-solcato e un po' pruinoso.

Epicute imeniforme, senza particolare contenuto pigmentato, in massa si osserva un pigmento parietale giallastro; dermatocistidi lecitiformi sparsi.

Spore (9,9) 10,7-12 (14) x 6-7,1 (7,5) μm , di faccia ovoidali o ellissoidali, di lato adassialmente appiattite con accenno di aspetto amigdaliforme (si potrebbero anche descrivere in misura tridimensionale dato che la larghezza di molte, ma non tutte, le spore osservate in vista laterale risiede nei valori inferiori del relativo range di variabilità; per questo motivo la raccolta è stata confrontata anche con *Conocybe subxerophytica* le cui spore sono descritte in tre dimensioni ma sono tuttavia banalmente lenticolari, senza aspetto amigdaliforme), poro distinto, centrale.

Basidi 4-sporici.

Giunti a fibbia presenti.

Cheilocistidi lecitiformi con capitulo largo 2,5-4 μm .

Cristalli osservati in imenio in NH_4 dopo ca. 20 min.

Caulocistidi all'apice del gambo principalmente lecitiformi, ca. -25 x -14 μm , con capitulo fino a 5,5 μm ; presenti anche cistidi non lecitiformi.