

SCHEDA N° 09

ORDINE Ascomycetes

GENERE <i>Discina</i>	SPECIE <i>Discina montana</i>	AUTORE (Harmaya) Ginns	
DATA DI RACCOLTA 12.04.2014	LUOGO DI RACC. Lorenzago	COMUNE Lorenzago	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 700/800	I.G.M. 030 2 Forni di Sopra	RACCOGLITORE Roberto Coletti (socio Mirano)	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |

BOSCO DI :

- | | | |
|---|---|------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO | <input type="checkbox"/> MORTO |
| | | DI <input type="text"/> |

ESPOSIZIONE: ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : bosco misto montano (conifere e latifolia)

NOTE : la specie è stata recapitata dal socio R. Coletti del gruppo micologico "Amici Micologi" di Mirano

MICROSCOPIA: Spore 22-33,5 x 9,5-15,5 µm, Q 1,6-2,6 (* vedi sotto)

BIBLIOGRAFIA :

DETERMINATORE S. Pizzardo e P. Voto

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



ASCOMI IN HABITAT



ASCHI OCTOSPOREI



SPORE IN FASE DI ESPULSIONE DALL'ASCO



PARAFISI



PARAFISI INGROSSATE ALL'APICE



SPORA CON APICOLI IN ENTRAMBI I PORI



DESCRIZIONE Spore 22-33,5 x 9,5-15,5 μm , Q 1,6-2,6, ellissoidali, fusi-romboidali, (strettamente) fusiformi, inizialmente lisce e a poli regolari, poi tendono a sviluppare un apicolo a entrambi i poli e a corrugare la parete;

aschi 8-sporici;

parafisi cilindracee, apice x6-8 μm , dopo conservazione in frigorifero sovente con apici rigonfi, eventualmente deformi, x10-15 μm .