

SCHEDA N° 10

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Inocybe</i>	SPECIE <i>I. asterospora</i>	AUTORE Quéél.	
DATA DI RACCOLTA 08-11-2014	LUOGO DI RACC. Boccon	COMUNE Vò Euganeo	PROV. PD
ALTITUDINE S.L.M. 250	I.G.M. 147 IV	RACCOGLITORE Gr. Mic. Castellano	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |

BOSCO DI: misto Latifoglie varie Castagno-Roverella

- | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> RADO | <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO | <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: Bosco misto Castagno e Roverella

NOTE: 2 singoli esemplari in un sentiero, su terreno molto umido tra le foglie sotto Roverella.

MICROSCOPIA: spore 9,5-12,5 x 8-11 µm. gibbose con aspetto stellato. Basidi clavati tetrasporici, cheilo metuloidi muricati a birillo.

BIBLIOGRAFIA: A.M.B. funghi d'Italia vol.1 pag.174 - Zanichelli pag.372 al 1034

DETERMINATORE Gr. Mic. Castellano

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



CARPOFORO



CAPPELLO



CHEILOCISTIDI



SPORE



DESCRIZIONE

Inocybe asterospora

Ordine: Agaricales
Famiglia: Cortinariaceae
Genere: Inocybe
Specie: Asterospora
Sezione: Marginatae Kuhner

Capello: 2,5-5 cm; conico-campanulato, poi appianato, con umbone \pm acuto; superficie fibrillosa, unita, poi, tranne al disco, nettamente sfilacciata-lacerata in senso radiale, bruno-rossiccio-castano contrastante con il tessuto sottostante chiaro.

Lamelle: poco fitte, bianche, poi grigio-olivastre.

Carne: biancastra, bruna nello stipite; odore complesso, terroso-spermatico.

Gambo: 4-8 x 0,4-0,8 cm; cilindrico dilatato alla base in un piccolo bulbo triangolare nettamente marginato; liscio, subconcolore al pileo, cosparso da una granulosità biancastra.

Spore: 9,5-12,5 x 8-11 μ m. gibbose e con protuberanze allungate che gli conferiscono una forma a stella. Basidi tetrasporici, clavati, cheilocistidi metuloidi muricati a birillo.

Habitat: in estate-autunno; gregaria in zone boschive, spesso sotto latifoglie più raramente sotto aghifoglie.

Autore della scheda: Gmc Castellano

Autore delle foto: Dino Giuseppe Cerantola