

SCHEDA N° 27/2015

ORDINE Cantharellales

GENERE Cantharellus	SPECIE C. amethysteus	AUTORE (Quél.) Sacc.	
DATA DI RACCOLTA 29-08-2015	LUOGO DI RACC. Frassènè Agordino	COMUNE Gosaldo	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. 1000 mt.	I.G.M. 45 II	RACCOGLITORE Pellizzari Renato	

HABITAT:

- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI : AGHIFOLGIA E LATIFOLGIA | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : bosco misto di aghifoglia e latifoglia, ma con prevalenza di Abete rosso e Fagus

NOTE : Gruppetti di funghi tra di loro appressati , consistenti e nascosti fra l'erba e il muschio.

MICROSCOPIA: Spore ellittiche 7-10 x 4.5-5 µm

BIBLIOGRAFIA : Funghi d'Italia A.M.B.vol. 2 pag.928 Funghi d'Italia Zanichelli pag. 524 al n. 1458 Bruno Cetto al 679

DETERMINATORE Cds Gmc

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



CANTHARELLUS AMETHYSTEUS



CANTHARELLUS AMETHYSTEUS2




CANTHARELLUS AMETHYSTEUS3



CANTHARELLUS-AMETHYSTEUS4



CANTHARELLUS-AMETHYSTEUS6



SPORE-BASIDI-TRAMA



DESCRIZIONE

Cantharellus amethysteus

Ordine: Cantharellales
Famiglia: Cantharellaceae
Genere: *Cantharellus*
Specie: *amethysteus*

Cappello: piano, depresso, carnoso, bordo involuto molto ondulato, di colore giallo o giallo arancio, coperto da squamette aderenti viola-lilacine che conferiscono alla superficie un aspetto appena screpolato.

Lamelle: costituite da venature in rilievo molto decorrenti sul gambo, anastomizzate, ramificate.

Carne: consistente, bianca poi giallognola, spessa e piuttosto fibrosa. Odore e sapore fruttato.

Gambo: subconico, irregolarmente cilindraceo, rastremato alla base, pieno, fibroso, concolore al cappello, talora ancora più ingiallente al tatto.

Spore: Spore ellittiche 7-10 x 4.5-5 µm.

Habitat: cresce in boschi di conifere, aghifoglie e misti, prevalentemente nel periodo estivo-autunnale, è una specie piuttosto rara.

Autore della scheda: Cds Gmc

Autore delle foto: Pellizzari Renato, Pinton Franco Flavio.