



FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI



SCHEDA N° 2015/03

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Coprinopsis</i>	SPECIE <i>cothurnata</i>	AUTORE (Godey) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	
DATA DI RACCOLTA 09-10-2015	LUOGO DI RACC. Via Garibaldi	COMUNE Villadose	PROV. RO
ALTITUDINE S.L.M. 1 m.	I.G.M.	RACCOGLITORE Voto Pietro	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input checked="" type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI : | | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : erbe graminacee

NOTE : zona periodicamente falciata e possibilmente con deiezioni animali

BIBLIOGRAFIA: chiave online: <http://www.grzyby.pl/coprinus-site-Kees-Uljee/species/Coprinus.htm>


DETERMINATORE Voto Pietro

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI


in habitat




cellule del velo




spore



cheilocistidio



basidi





DESCRIZIONE

Cappello ancora chiuso, cilindraceo o conico-cilindraceo, -12 mm e -14 mm in altezza, bianco-biancastro, superficie unita, velo diffuso e labile di flocculi biancastri all'esterno e ocraceo-rosato pallido al centro, esemplari molto vecchi a margine fortemente revoluto;

Lamelle strette, mediamente fitte, grigio scuro, margine bianco;

Gambo 25-40x2-3 mm, bianco con base tendente a macchiarsi di ocraceo, coperto di velo flocculoso diffuso;

pileipellis cellulare;

velo composto di cellule (sub)globose, fino a 102x92 μm , lisce, coperte di granulazioni ocracee, frammiste da ife snelle e diverticolate;

spore 10-15,5 x 6,9-9,4 (10) μm , ellissoidali o ovoidali, sovente con accenno a conformazione esagonale, lateralmente più strette e ellissoidali o subamigdaliformi, poro centrale;

basidi 4-sporici, dimorfici, circondati da 3-5 pseudoparafisi;

pleurocistidi e cheilocistidi scarsi, -150x-60 μm , vescicolosi, ellissoidali;

giunti a fibbia presenti.

Questa specie sembra caratterizzata tra i "*Nivei*" per le grandi spore con un accenno alla morfologia esagonale. *Coprinopsis cothurnata* var. *equsterca* Atri, A. Kaur & M. Kaur, creata nel 2014 dall'India, avrebbe spore un po' più piccole, 8.5-13 x 5-8.5 μm , pleurocistidi e giunti a fibbia assenti.