



SCHEDA N° 07/2015

ORDINE Agaricales

GENERE Coprinopsis	SPECIE <i>C. lagopus</i>	AUTORE (Fr.:Fr.) Redhead, Vilgalys & Mon.	
DATA DI RACCOLTA 20.11.2015	LUOGO DIRACC. Bosco di Carpenedo	COMUNE Mestre - VE	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 0 m	I.G.M.	RACCOGLITORE A. Tulini	

HABITAT:

<input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: LATIFOLIA		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE :

MICROSCOPIA: Spore 12,3 - 13,7 x 6,4 - 7,2 µm, Qm = 1,87, ellissoidali-amigdaliformi, lisce con poro germinativo centrale.

BIBLIOGRAFIA: Breitenbach J.- Kränzlin F. - 1995 : Champignons de Suisse, Tomo 4 - pag. 240 - Champignons à lames 2° - Ed. Mykologia. Lucerna.

DETERMINATORE GG. Ferrarese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



PH. G.G. FERRARESE



PH. G.G. FERRARESE



PH. G.G. FERRARESE



SPORE 1000 X



CHEILOCISTITIO 1000 X



gruppo micologico
«BRUNO CETTO»
venezia - mestre
anno di fondazione 1976

DESCRIZIONE

Cappello: 20- 45 mm, inizialmente completamente ricoperto da squame biancastre lanose, residui del velo, fugaci, striato fino al disco, di colore grigiastro, col centro sfumato di brunastro-ocraceo.

Lamelle: libere al gambo, biancastre, poi grigiastre ed infine nerastre, col filo intero.

Gambo : 80 -110 x 3 - 5 mm, fragile, bianco, fibrilloso-fioccoso, poi liscio.

Carne: biancastra, sapore dolce, odore debole.

Microscopia: Spore 12,3 - 13,7 x 6,4 - 7,2 μm , Qm = 1,87, ellissoidali-amigdaliformi, lisce con poro germinativo centrale, cheilocistidi vescicolosi, lageniformi.

Habitat : isolato o in piccoli gruppi , su terreno o nell'erba, nei prati, non fimicolo.

Note : Questo fungo che cresce su terreno ricco di detriti organici è facilmente riconoscibile per il contrasto fra le fibrille bianche del velo col fondo grigiastro e per l'ambiente di crescita non coprofilo.

Elaborazione scheda: L. Tegen - Microscopia : C. Zaffalon - S. Refellato