



FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI



SCHEDA N° 2015/02

ORDINE AGARICALES

GENERE <i>Inocybe</i>	SPECIE <i>I. terrigena</i>	AUTORE (Fr.) Kühner	
DATA DI RACCOLTA 20-9-2015	LUOGO DI RACC. Val Visdende	COMUNE Belluno	PROV. BL
ALTITUDINE S.L.M. ca. 1500	I.G.M.	RACCOGLITORE Voto P.	

HABITAT:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| <input checked="" type="checkbox"/> BOSCO DI: peccio | | <input checked="" type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : **pecci, muschio**

NOTE :

MICROSCOPIA:

BIBLIOGRAFIA : **BON M. 1997**

DETERMINATORE **Voto P.**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI

carpoforo in habitat



KOH sul cappello




carpoforo in habitat



spore



Cheilocistidi in rosso Congo





DESCRIZIONE

Cappello 2,5-4,5 cm, convesso, bruno-rugginoso, bruno-arancione, più scuro al centro, con ornamentazione feltrata-squamata al margine e anche debordante; bruno violaceo scuro con KOH. Lamelle brune sfumate di olivastro, fitte, smarginate con o senza dentino di decorrenza. Gambo 25-40x8-11 mm, ocraceo sotto un vistoso rivestimento squamoso bruno-ocraceo terminante in alto in una zona anulare.

Carne giallastra-ocracea, odore distintamente terroso..

Spore ca. 8,2-11,6x5,1-6,9 μm , Q (1,4)1,55-1,7(1,85), lisce, ellissoidali con apice rastremato, di lato appiattite e alcune subfaseoliformi o subamigdaliformi.

Cheilocistidi clavati o cilindracei, di rado utriformi, non muricati, settati, ultimo elemento fino a 30x7-16 μm , assenti.

Fibbie presenti; Basidi 4-sporici.

L'habitat continentale a tendenza igrofila e la vistosa ornamentazione velare sul gambo agevolano molto la sua determinazione all'interno del sottogenere *Inosperma* Kühner, Sezione *Depauperatae* Lange, sottosezione *Terrigenae* Bon dove si trova accanto a *I. heimi*, non così squamata e tendenzialmente sabulicola.