



SCHEDA N° 13/2015

ORDINE Russulales

GENERE Lactarius	SPECIE L. subumbonatus	AUTORE Lindgren	
DATA DI RACCOLTA 27-11-2015	LUOGO DIRACC. Boscone della Mesola	COMUNE Mesola	PROV. RA
ALTITUDINE S.L.M. 0 m	I.G.M.	RACCOGLITORE S. Refellato	

HABITAT:

<input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI	<input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI	<input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA
<input type="checkbox"/> TERRENO NUDO	<input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO	<input type="checkbox"/> ARENILE
<input type="checkbox"/> TORBIERA	<input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A	
<input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME	<input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO	<input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO
BOSCO DI: LATIFOLIA		<input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO
<input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO	<input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO	<input type="checkbox"/> IN RADURE
<input type="checkbox"/> SU LEGNO	<input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO	DI

ESPOSIZIONE:

ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Quercus - carpinus

NOTE :

MICROSCOPIA: Spore globose, 6,7 - 7,9 x 6,5 - 7,8 µm, Qm = 1,03, sporata crema-ocracea in massa.

BIBLIOGRAFIA : Consiglio G.- Papetti C. - 2001 : Atlante fotografico dei Funghi d' Italia. Vol. 2 -pag. 870 - Edit. Associazione Micologica Bresadola, Fondazione Studi Micologici. Trento.

DETERMINATORE L. Tegon

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



PH. L. TEGON



PH. L. TEGON



PH. L. TEGON



SPORE 1000 X



SPORE 1000 X



BASIDI 1000 X



gruppo micologico
«BRUNO CETTO»
venezia - Mestre
anno di fondazione 1976

DESCRIZIONE

Cappello : 35-55 mm, depresso, con piccolo o appena accennato umbone, il margine striato-scanalato, sinuoso, involuto, aspetto asciutto, opaco, rugoso-granuloso di color bruno-cannella.

Lamelle : adnate, non molto fitte con lamellule di varie dimensioni, di colore da giallo-ocraceo-aranciato a ocraceo-aranciato.

Gambo : 30-45 x 5-7 mm, cilindraceo, cavo, pruinoso all'apice, colore rossiccio che scurisce con l'età.

Carne : scarsa di colore ocraceo-chiaro, con odore inizialmente erbaceo-cimicino, poi di cicoria tostata e sapore mite.

Microscopia : Spore globose, 6,7 - 7,9 x 6,5 - 7,8 μm , Qm = 1,03, con verruche collegate da creste che formano un reticolo a maglie larghe quasi completo, basidi con sterigmi lunghi 8-10 μm , cistidi di forma molto variabile, sporata crema-ocracea in massa.

Habitat : nei boschi di latifolia, gregaria, abbastanza comune, autunnale.

Elaborazione scheda: L. Tegen - Microscopia : C. Zaffalon - S. Refellato