



SCHEDA N° 18/2015

ORDINE Agaricales

GENERE Psathyrella	SPECIE P. ammophila	AUTORE (Durieu & Lév.) P.D. Orton	
DATA DI RACCOLTA 19.03.15	LUOGO DI RACC. Valle Vecchia	COMUNE Caorle	PROV. VE
ALTITUDINE S.L.M. 0 m	I.G.M.	RACCOGLITORE G.G. Ferrarese	

HABITAT:

☐ PRATI ERBOSI	☐ ORTI E GIARDINI	☐ MARGINI DI STRADA
☐ TERRENO NUDO	☐ TERRENO SABBIOSO	☒ ARENILE
☐ TORBIERA	☐ TERRENO COLTIVATO A	
☐ ARGINE DI FIUME	☐ LUOGO BRUCIATO	

BOSCO DI:

☐ DENTRO AL BOSCO	☐ AI MARGINI DEL BOSCO	☐ BOSCO SUBALPINO
☐ SU LEGNO	☐ VIVO ☐ MORTO DI	☐ RADO ☐ FITTO
		☐ IN RADURE

ESPOSIZIONE:

☐ ASSOLATA ☐ OMBROSA ☐ MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

☐ ACQUITRINOSO ☐ MOLTO UMIDO ☐ UMIDO ☒ ASCIUTTO ☐ SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE :

NOTE :

MICROSCOPIA: Spore 11-13,5 x 6-7 µm, da ovoidali a subamigdaliformi, bruno-rossastro scure al MS, lisce.

BIBLIOGRAFIA : Monti G./ Marchetti M./ Gorreri L/ Franchi P. - Funghi di ambienti dunali - Edito da Ente Parco Regionale Migliarino S. Rossore e Università degli studi di Pisa - Pag. 164.

DETERMINATORE G.G. Ferrarese

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI ☒ FRESCHI ☐ SECCHI



PH. G.G. FERRARESE




PH. G.G. FERRARESE




HABITAT - PH. G.G. FERRARESE



SPORE 1000 X



CHEILOCISTIDI 600 X



BASIDIO 600 X



gruppo micologico
«BRUNO CETTO»
venezia - Mestre
anno di fondazione 1978

DESCRIZIONE

Cappello: 15-45 mm di diametro, da paraboloidale a convesso, infine spianato, margine sottile, crenulato a maturità, superficie igrofana, sericeo-fibrillosa, liscia, un pò striata al margine, colore bruno-ocraceo chiaro, bruno-dattero, con tonalità più chiare al margine, giallo brunastro chiaro con il secco.

Lamelle da annesse a adnate con dentino, sottili, ventricose, spaziate, con il filo crenulato-fimbriato, colore da grigio-brunastro a bruno-nerastro con tonalità purpuree.

Gambo 30- 85 x 2-6 mm, cilindraceo, talvolta compresso, diritto o flessuoso, tenace, midolloso, striato-fibrilloso, pruinoso all'apice, colore da biancastro a ocraceo chiaro, infisso profondamente nella sabbia.

Carne brunastra nel cappello, biancastra nel gambo, odore non significativo, sapore leggero erbaceo-fungino.

Habitat: Specie che vive esclusivamente sulla prima duna dei litorali, direttamente sulla sabbia o su aree muschiose, talvolta anche a poca distanza dalla battigia, comune; dall'autunno alla primavera.

Microscopia: spore 11-13,5 x 6-7 μm , da ovoidali a lenticolari di faccia, subellissoidali viste di profilo, l'apice è ottuso, bruno-rossastro scure al MS, lisce; con poro germinativo evidente; basidi 25-35 x 10-12 μm clavato-sferopedunculati, tetrasporici; Cheilocistidi 30-60 x 11-22 μm , versiformi: subfusiformi con apice ottuso, ventricoso-fusiformi, utrififormi e clavati, frammisti a cellule sferopeduncolate; i pleurocistidi di forma simile misurano 25-65 x 10-25 μm .

Elaborazione scheda: L. Tegon - Microscopia : C. Zaffalon - S. Refellato