

SCHEDA N°

ORDINE Amanitales

GENERE Amanita	SPECIE Amanita ovoidea	AUTORE (BULL.:FR.) LINK	
DATA DI RACCOLTA 29.10.2016	LUOGO DI RACC. v.le corte Cappellini	COMUNE Rovigo (loc. Sarzano)	PROV. RO
ALTITUDINE S.L.M. 5/6	I.G.M. 168 II Villadose	RACCOGLITORE S. Pizzardo	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |
| BOSCO DI : | | <input type="checkbox"/> RADO <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: **Tilia cordata**

NOTE: **Frequentemente la specie si rinviene nei dintorni di Rovigo e in città, sempre sotto Tiglio.**

MICROSCOPIA: **9,5-11 x 6-9,5 µm, ellissoidali, lisce, amiloidi, sporata bianca in massa.**

BIBLIOGRAFIA: **Papetti, Consiglio, Simonini "Funghi d'Italia" Vol. 1, Ed. AMB; P. Neville&S. Poumarat "Amanitaceae" Vol. 9 - Ed. Candusso**

DETERMINATORE **S. Pizzardo**


RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI



LUOGO RACCOLTA



SPOROCARPI IN HABITAT



IFE VELO GENERALE



IFE VELO PARZIALE



SPORE



DESCRIZIONE:

NOTA:

comunemente conosciuta come "Farinaccio" per la presenza di lembi farinosi nelle sue parti, o anche Ovolo bianco (per la sua forma iniziale) *A. ovoidea* è un bel fungo, molto vistoso, facilmente riconoscibile per la sua taglia (il cappello può raggiungere i 25 - 30 cm di diametro e per i residui del velo generale riportati) .

Recenti casi di intossicazione, che inizialmente gli erano stati attribuiti, ne addossano la colpa all'*Amanita proxima* Dumée, specie morfologicamente simile ma con volva spesso giallastro-ocracea.

Se ne consiglia pertanto accortezza nella determinazione, in caso d'eventuale consumo, per non scambiarsela per quest'ultima.