

SCHEDA N°

ORDINE Russulales

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|
| GENERE Lactarius | SPECIE Lactarius pterosporus | AUTORE ROMAGN. | |
| DATA DI RACCOLTA 11/08/2018 | LUOGO DI RACC. Enego | COMUNE Enego | PROV. (VI) |
| ALTITUDINE S.L.M. 750 m. | I.G.M. II - 082 | RACCOLTITORE un socio gruppo Vicenza | |

HABITAT:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |

BOSCO DI: **Faggio**

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> IN RADURE |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO | <input checked="" type="checkbox"/> MORTO |
| | | DI |

ESPOSIZIONE: ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE: **Faggio e qualche Abete**

NOTE :

MICROSCOPIA: **Lamelle e spore, questultime: molto difficoltoso riuscire a fotografarle e evidenziare la spora alata**

BIBLIOGRAFIA: **J.Breitenbach / F. Kranzlin - Tome n. 6**

DETERMINATORE **Evelina Zanella**

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI





FEDERAZIONE MICOLOGICA DEI GRUPPI VENETI



DESCRIZIONE

Cappello: 5 - 10 cm, convesso con depressione centrale, piccolo umbone al centro, gibboso, tipicamente rugoso radialmente, colore bruno fuliginoso.

Lamelle: giallognole, sottili, adnate al gambo;

Gambo: 4-8 cm, cilindrico con lievi striature, colore grigio brunastro;

Carne: bianca, alla sezione si colora di rosato, odore indefinito;

Lattice: bianco, prima mite poi molto acre;

Microscopia: spore subsferiche con aculei distanziati, con ornamentazioni alate;

Habitat: boschi misti di latifoglie.