

SCHEDA N°

ORDINE Agaricales

GENERE <i>Lepiota</i>	SPECIE <i>L. lilacea</i>	AUTORE BRESADOLA	
DATA DI RACCOLTA 161118	LUOGO DI RACC. porto Fossone	COMUNE Rosolina	PROV. RO
ALTITUDINE S.L.M. 0 mt	I.G.M. 169 I S. Anna	RACCOGLITORE S. Pizzardo E. Naccari	

HABITAT:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRATI ERBOSI | <input type="checkbox"/> ORTI E GIARDINI | <input checked="" type="checkbox"/> MARGINI DI STRADA |
| <input type="checkbox"/> TERRENO NUDO | <input checked="" type="checkbox"/> TERRENO SABBIOSO | <input type="checkbox"/> ARENILE |
| <input type="checkbox"/> TORBIERA | <input type="checkbox"/> TERRENO COLTIVATO A | |
| <input type="checkbox"/> ARGINE DI FIUME | <input type="checkbox"/> LUOGO BRUCIATO | <input type="checkbox"/> BOSCO SUBALPINO |

BOSCO DI: *Pinus pinea* e *Quercus ilex*

- | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> DENTRO AL BOSCO | <input checked="" type="checkbox"/> AI MARGINI DEL BOSCO | <input type="checkbox"/> RADO | <input type="checkbox"/> FITTO |
| <input type="checkbox"/> SU LEGNO | <input type="checkbox"/> VIVO | <input type="checkbox"/> MORTO | DI |

ESPOSIZIONE:

- ASSOLATA OMBROSA MEDIA

UMIDITA' DEL TERRENO

- ACQUITRINOSO MOLTO UMIDO UMIDO ASCIUTTO SECCO

VEGETAZIONE CIRCOSTANTE : Pini e Lecci

NOTE : numerose specie raggruppate lungo il margine della strada tutte con evidente anello color malva scuro;

MICROSCOPIA: 5.5 x 3 µm, elissoidi

BIBLIOGRAFIA : Atlante fotografico dei Funghi d'Italia vol. 2 - Ed. AMB (TR) 2008

DETERMINATORE S. Pizzardo - E. Naccari

RILIEVI EFFETTUATI SU REPERTI FRESCHI SECCHI





DESCRIZIONE

Cappello: 4-5 cm, sferico, inizialmente convesso infine piano, con esiguo umbone al centro; cute asciutta, color bruno porpora, bruno-vinoso, dissociata in squamule lilacee, sempre più rade dal centro alla periferia.

Lamelle: fitte, libere al gambo, appena ventricose, bianche, poi bianco-giallastre, lamellule di varia lunghezza, filo crenulato-fioccoso.

Gambo: 2-4 x 0.3-0.5 cm, cilindrico, flessuoso, fistoloso e infine cavo, con lieve ingrossamento basale e rizoidi miceliari bianchi. E' presente un anello infero bianco con bordo esterno di colore viola-vinoso.

Carne: biancastra, ma vinosa nella corteccia del gambo con odore leggero, gradevole quasi fruttato.

Habitat: a gruppi numerosi al margine dei boschi di latifoglie, nei prati, nei parchi.

Microscopia: spore 4 - 5,5 x 2,5 - 3 μm , ellittiche, metacromatiche, basidi claviformi, tetrasporici, giunti a fibbia presenti in tutto il carpoforo.